

MAXIPIME

(kefepiimi)

0,5 g, 1 g ja 2 g injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

LASKIMON SISÄINEN INJEKTIO

Maxipime 0,5 g liuotetaan 5 ml:aan, 1 ja 2 g 10 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä. Neste injisoidaan hitaasti laskimoon 3-5 minuutin aikana.

LASKIMON SISÄINEN INFUUSIO

Maxipime liuotetaan 50-100 ml:aan infuusionestettä ja infusoidaan hitaasti 20-30 minuutin aikana.

Sekoitettavuus: Maxipime voidaan sekoittaa natriumkloridi-infuusionesteeseen 9 mg/ml, glukoosi-infuusionesteeseen 50 mg/ml tai 10 mg/ml. Maxipime-nesteitä, kuten useimpia beetalaktaamiantibioottien nesteitä, ei tule lisätä metronidatsolia, vankomysiinia, gentamysiiniä, tobramysiinisulfaattia tai netilmisiinisulfaattia sisältäviin nesteisiin fysikaalisen tai kemiallisen yhteensopimattomuuden takia. Jos samanaikainen Maxipime-hoito on kuitenkin tarpeen, jokainen näistä antibiooteista voidaan antaa kuitenkin erikseen.

LIHAKSEN SISÄINEN INJEKTIO

Maxipime 0,5 g liuotetaan 1,5 ml:aan, 1 g 3 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä tai lidokaiini-injektionestettä 5 mg/ml tai 10 mg/ml.

KELPOISUUSAIKA JA SÄILYTYS

Injektionpullot on säilytettävä kotelossa, koska Maxipime on valonarkaa.

Valmis injektioneste säilyy 12 tuntia huoneenlämmössä (+15 - 25°C) tai 24 tuntia jääkaapissa (+2 - 8°C). Valmis infuusioneste tulee käyttää 12 tunnin kuluessa.

Nesteiden väri voi vaihdella värittömästä vaalean keltaiseen.

7.1.2003

MAXIPIME

(cefepim)

0,5 g, 1 g och 2 g pulver till injektions- och infusionsvätska, lösning

INTRAVENÖS INJEKTION

Maxipime 0,5 g löses i 5 ml, 1 och 2 g i 10 ml vatten för injektionsvätskor. Lösningen injiceras långsamt intravenöst under 3-5 minuter.

INTRAVENÖS INFUSION

Maxipime löses i 50-100 ml infusionsvätska och infunderas långsamt under 20-30 minuter.

Blandbarhet: Maxipime är blandbart med natriumklorid 9 mg/ml, glukos 50 mg/ml eller glukos 100 mg/ml infusionsvätskor. Som för de flesta betalaktam-antibiotika bör Maxipimelösningar inte sättas till lösningar av metronidazol, vancomycin, gentamicin, tobramycin sulfat eller netilmicin sulfat på grund av fysikalisk eller kemisk inkompatibilitet. Däremot kan dessa antibiotika administreras separat om samtidig behandling med Maxipime är indicerad.

INTRAMUSKULÄR INJEKTION (FIN)

Maxipime 0,5 g löses i 1,5 ml, 1 g i 3 ml vatten för injektionsvätskor eller lidokain (Xylocain) injektionsvätska 5 mg/ml eller 10 mg/ml.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen, då Maxipime är känsligt för ljus. Färdigberedd injektionsvätska är hållbar 12 timmar vid högst 25°C eller 24 timmar vid förvaring vid 2-8°C (i kylskåp). Färdigberedd infusionsvätska bör användas inom 12 timmar.

Lösningar kan variera i färg från ofärgade till ljusst gula.

7.1.2003