

PAKKAUSSELOSTE

Questran 4 g/annos jauhe kolestyramiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Questran on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Questrania
3. Miten Questrania käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Questranin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ QUESTRAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Questrania käytetään:

- alentamaan veren kohonnutta kolesterolipitoisuutta, kun ruokavaliohoito ei ole riittävä
- sappitiehyiden tukoksesta johtuvaan ihon kutinaan
- suolen suuren sappihappomäärän aiheuttamaan ripuliin.

Questran sitoo itseensä ohutsuolessa sappihappoja, jotka muodostuvat kolesterolista. Sappihappojen uudelleenmuodostumisessa tarvittava kolesteroli on lähtöisin verestä ja tämän vaikutuksesta veren kolesterolipitoisuus vähenee.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT QUESTRANIA

Älä käytä Questrania

- jos olet allerginen (yliherkkä) kolestyramiinille tai Questranin jollekin muulle aineelle.
- sappitiehyiden täydellisen tukoksen yhteydessä.

Ole erityisen varovainen Questranin suhteen

- jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus.
- jos käytät valmistetta hyvin pitkäaikaisesti, sillä hoito voi vähentää rasvaliukoisten vitamiinien imeytymistä ja K-vitamiinin puute lisää verenvuototaipumusta. Tietyissä tapauksissa voi olla tarpeen ottaa A-, D-, ja K-vitamiineja ennaltaehkäisevästi.
- jos sinulla on ummetusta.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Questranin käyttö samanaikaisesti joidenkin muiden lääkevalmisteiden kanssa voi vaikuttaa niiden tehoon. Neuvottele lääkärin kanssa ennen muiden lääkevalmisteiden käyttöä samanaikaisesti.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Valmisteen käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi kokemusta. Neuvottele aina lääkärin kanssa ennen Questranin käyttöä raskauden aikana.

Kolestyramiini ei imeydy äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vaikutuksia ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole havaittu.

Tärkeää tietoa Questranin sisältämistä aineista

Jos et voi käyttää joitain sokereita, ota yhteys lääkäriin ennen valmisteen käyttöä.

Huolehdi suuhygieniasta hyvin, koska Questran sisältää sokeria (sakkarosia).

3. MITEN QUESTRANIA KÄYTETÄÄN

Käytä Questrania juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille on 2–4 annosjauhepussia 2–3 kertaa päivässä.

Lapset: Annoksen määrää lääkäri, joka sovittaa sen yksilöllisesti lapsen painon ja iän mukaan.

Kovan vatsan ja ummetuksen välttämiseksi otetaan ensimmäisen viikon aikana ½ annosjauhepussia päivässä ja sen jälkeen annosta lisätään viikon välein haluttuun annokseen. Muut lääkkeet tulee ottaa tunti ennen Questrania tai 4-6 tuntia Questranin jälkeen, jotta Questran ei estäisi muiden lääkkeiden imeytymistä.

Jauhe sekoitetaan veteen, mehuun, tuoremehuun tai muuhun juomaan. Sen voi myös hyvin sekoittaa keittoihin tai hienojakoisiin hedelmiin, esimerkiksi omenasoseeseen tai murskattuun ananakseen.

Jos käytät enemmän Questrania kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren määrän lääkettä tai jos esimerkiksi lapsi on vahingossa ottanut lääkettä, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (p. 09-471 977 Suomessa ja p. 112 Ruotsissa) riskin arvioimiseksi ja saadaksesi toimintaohjeet.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Questranin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Questranin käyttäjillä: muutokset veren protrombiinipitoisuudessa, painon nousu, painon lasku, verenvuototaipumus, veren proteiinipitoisuuden pieneneminen, anemia, imusolmukesairaus, isot mustelmat, päänsärky, huimaus, pyörtyminen, uneliaisuus, hermosärky, pistely, makuhäiriö, hämäräsokeus (A-vitamiininpuutteen yhteydessä), silmän suonikalvoston tulehdus, tinnitus, huimaus, astma, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus, hikottelu, ummetus, haimatulehdus, vatsavaivat, ilmavaivat, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, dyspepsia, rasvaripuli, kielitulehdus, peräsuolivaivat, maha-suolikanavan verenvuoto, peräsuolen verenvuoto, ulosteen värjäytyminen, peräpukamiin liittyvä verenvuoto, pohjukais-suolihaavan verenvuoto, nielemishäiriö, peräsuolikipu, röyhtäily, akuutti vatsa, hammaskaries, suun verenvuoto, suolitukos, paksusuolen tulehdus, verivirtsaisuus, vaikeus virtsata, epänormaali virtsan haju, runsasvirtsaisuus, ihottuma, ihoärsytys, nokkosihottuma, osteoporoosi selkäkipu, lihaskipu, nivelkipu, nivel-tulehdus, A-vitamiininpuute, K-vitamiinin puute, D-vitamiininpuute, veren liiallinen happamuus, veren kloridin runsaus (lapsilla), anoreksia, väsymys, turvotus, sappikivitauti, sappirakon kalkkeuma, sappikivut, epänormaali maksan toimintakoe, lisääntynyt seksuaalinen halukkuus ja ahdistuneisuus.

Pitkäaikaisen hoidon yhteydessä voi esiintyä K-vitamiinin puutetta, mikä voi lisätä verenvuototaipumusta ja A-vitamiinin puutetta, joka voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa hämäräsokeutta. Myös luukatoa ja foolihapon puutosta on esiintynyt.

Ilmoita aina lääkärille kiusallisista haittavaikutuksista tai haittavaikutuksista, joita ei ole edellä mainittu.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. QUESTRANIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Questran sisältää

- Vaikuttava aine on kolestyramiini 4 g / annosjauhepussi.
- Muut aineet ovat sakkaroosi, akaasiakumi, propyleeniglykolialginaatti, vedetön sitruunahappo, polysorbaatti 80, makuaine (appelsiini).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pakkaus, jossa on 50 annosjauhepussia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Bristol-Myers Squibb AB
Box 15200
SE-167 15 Bromma
Ruotsi

Valmistaja

Bristol-Myers Squibb
Usine de Meymac
La Goualle-BP 6
19250 Meymac
Ranska

Farnea

10 rue Bouche Thomas
ZAC d'Orgemont
49000 Angers
Ranska

Lisätietoa antaa

Suomessa:
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Metsänneidonkuja 8
FIN-02130 ESPOO

Ruotsissa:
Bristol-Myers Squibb AB
Box 15200, SE-167 15 Bromma

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 03.06.2010