

Vepesid[®] 50 mg kapselit, pehmeät

Huomattavaa, että lääkäri voi määrätä valmistetta muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai muulla annostuksella kuin mitä pakkausselosteessa on mainittu. Noudattakaa aina lääkärin määräystä ja pakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Mitä Vepesid sisältää?

Vaikuttava aine: Etoposidi 50 mg
Muut aineet: Sitruunahappo (vedetön), glyseroli 85%, puhdistettu vesi, makrogoli 400, liivate, natriumetyyliiparahydroksibentsoaatti (E215) ja natriumpropyyliiparahydroksibentsoaatti (E217), titaaniidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172)

Myyntiluvan haltija

Bristol-Myers Squibb AB
Box 15200
SE-167 15 Bromma
Ruotsi

Valmistaja

Corden Pharma Latina S.p.A.
Via del Murillo Km 2.800
04013 Sermoneta
Latina, Italia

Lisätietoa antaa

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab
Metsänneidonkuja 8
02130 Espoo

Miten Vepesid vaikuttaa?

Vepesid estää solujen jakautumisen nopeasti jakautuvissa soluissa, kuten syöpäsoluissa. Tämä johtaa solukuolemaan.

Käyttötarkoitukset

Vepesidiä käytetään keuhko- ja kivessyöpään, akuuttiin leukemiaan (verisyöpä) sekä muihin veri- ja lymfajärjestelmien syöpätyyppeihin. Lääkäri voi määrätä lääkettä muuhun käyttötarkoitukseen.

Milloin Vepesidiä ei tule käyttää?

Valmistetta ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana tai jos on allerginen jollekin valmisteen aineelle.

Mitä on otettava huomioon ennen Vepesid-hoitoa ja sen aikana

Jos munuaisten, maksan tai luuytimen toiminta on heikentynyt, voi annoksen pienentäminen tai hoidon lopettaminen olla tarpeen. Ennen hoidon aloittamista on hoidettava mahdolliset tulehdukset.

Raskaus

Koska sikiövaurio on mahdollinen, ei Vepesidiä saa käyttää raskauden aikana muutoin kuin lääkärin määräyksestä.

Imetys

Vepesidiä ei saa käyttää imetyksen aikana.

Annostusohjeet

Annoksen määrää lääkäri, joka sovittaa sen yksilöllisesti. Kapselit tulee ottaa tyhjään mahaan ja niellä kokonaisina veden kera.

Yliannostus

Jos valmistetta on otettu vahingossa liian suuri annos, on otettava yhteys lääkäriin tai sairaalaan (tai Myrkytystietokeskukseen, puh. 09-4711).

Haittavaikutukset

Tavallisia haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu ja hiusten lähtö, jotka kaikki ovat ohimeneviä. Valkosolujen tuotannon heikkeneminen on myös tavallista. Valkosolujen tuotanto lisääntyy jälleen, jos hoito keskeytetään tilapäisesti.

Harvinaisia haittavaikutuksia ovat ripuli, ruokahaluttomuus, vatsakivut sekä suu- ja limakalvotulehdukset.

Erittäin harvinaisia haittavaikutuksia ovat pistely, kutina ja ihottuma, väsymys, ummetus sekä yliherkkyysoireet sekä kuume, hengitysvaikeudet ja korkea pulssi.

Jos ilmaantuu odottamattomia tai kiusallisia haittavaikutuksia, on otettava välittömästi yhteys lääkäriin.

Säilytys ja kelpoisuus aika

Valmiste on käytettävä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää. Säilytä alle 25°C. Ei lasten ulottuville.

Pakkausseloste on laadittu 21.7.2010